

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ХОФИТОЛ **CHOPHYTOL**

Регистрационный номер: П N013320/01

Торговое название: **ХОФИТОЛ**
CHOPHYTOL

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав (на 1 таблетку)

Ядро таблетки:

Активный компонент:

Артишока полевого (*Synara scolymus* L.)
листьев экстракт сухой (водный) 200 мг (0,20 г)

Вспомогательные вещества:

Магния трисиликат 12,00 мг,

Крахмал кукурузный 22,00 мг,

Тальк 3,00 мг,

Магния стеарат 3,00 мг.

Оболочка таблетки:

Гуммилак 1,1520 мг,

Канифоль 1,1520 мг,

Тальк 16,300 мг

Желатин 0,384 мг,

Сахароза 86,146 мг,

Карбонат кальция 2,2 мг,

Краситель дисперсный* 2,580 мг,

Карнаубский воск 0,082 мг,

Полисорбат 80 0,004 мг

*Состав красителя дисперсного: сахароза, оксиды железа желтого, черного и коричневого (E 172), метилпарагидроксибензоат (E 218) и этилпарагидроксибензоат (E 214).

Описание

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Желчегонное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A05AX

Фармакологические свойства

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав листьев артишока полевого биологически активных веществ. Цинарин в сочетании с фенолокислотами обладает желчегонным, а также гепатопротективным действием. Аскорбиновая кислота, каротин, витамины В1 и В2, инулин способствуют нормализации обменных процессов.

Обладает также диуретическим действием и усиливает выведение мочевины.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов, хронических гепатитов, цирроза печени; хронического нефрита, хронической почечной недостаточности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчно-каменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей.

Детский возраст до 6 лет.

Применение в период беременности и кормления грудью

Применение Хофитола в период беременности и кормления грудью возможно только по назначению и под контролем врача.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды.

Детям старше 6-и лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды.

Курс лечения – 2-3 недели.

Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

12 таблеток в блистере ((ПВХ – алюминий), (ПВХ/ ПВДХ/ПЭ-алюминий)), пять блистеров помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

30 таблеток в блистере ((ПВХ – алюминий), (ПВХ/ ПВДХ/ПЭ-алюминий)), два блистера помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

30 таблеток в блистере ((ПВХ – алюминий), (ПВХ/ ПВДХ/ПЭ-алюминий)), шесть блистеров помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

По 60 и 180 таблеток в полипропиленовую трубу, закрытую полиэтиленовой крышкой, с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Произведено:

Лаборатории РОЗА-ФИТОФАРМА

68, rue Жан-Жак Руссо

75001 Париж, Франция

Все претензии по качеству препарата направлять:

РОССИЯ 123610 Москва,

Краснопресненская наб.12,

ЦМТ, «Международная-2», офис 742

Тел.: (495)2582006, факс (495)2582007

