

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата

# ПИКОВИТ® ФОРТЕ

**Pikovit® FORTE**

таблетки, покрытые оболочкой

**витаминовые таблетки**

не содержат сахар

**alfatabs.ru**

**Регистрационный номер: П N013746/01**

**Торговое название препарата: ПИКОВИТ® ФОРТЕ**

**Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой**

**Состав:**

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

**Активные вещества:**

Ретинола пальмитат концентрат* (масляная форма), синтетический (1,7 Mio ME/г) (витамин А)	2,94 мг
Колекальциферол концентрат**, масляная форма (1 Mio ME/г) (витамин D <sub>3</sub> )	0,4 мг
Аскорбиновая кислота (витамин С)	60 мг
Тиамин мононитрат (витамин В <sub>1</sub> )	1,5 мг
Рибофлавин (витамин В <sub>2</sub> )	1,7 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В <sub>6</sub> )	2 мг
Цианокобаламин 0,1% в маннитоле (витамин В <sub>12</sub> )	6 мг
Никотинамид	20 мг

Фолиевая кислота	0,4 мг
Кальция пантотенат	10 мг
α-токоферола ацетат, 50 % гранулят *** (витамин E)	30 мг

**Вспомогательные вещества:** маннитол, аспартам, ароматизатор Мандарин, полисорбат 80, глицерол, касторовое масло, малтитол\*\*\*\*, магния стеарат, воск эмульсионный (Капол Фарма 600), повидон, кремния диоксид коллоидный, безводный, титана диоксид (E 171), бетакаротен (E 160a).

\* - ретинола пальмитат концентрат содержит: ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол.

\*\* - колекальциферол концентрат содержит: колекальциферол, DL-α-токоферол и триглицериды среднецепочные жирных кислот.

\*\*\* - α-токоферола ацетат, 50% гранулят содержит: 50% DL-α-токоферола ацетат в желатино-углеводной матрице.

\*\*\*\* - в процессе производства используется малтитол в виде 75% раствора.

**Описание:** круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой от светло-оранжевого до темно-оранжевого цвета. Допускаются вкрапления.

**Фармакотерапевтическая группа:** поливитаминное средство.

**Код АТХ:** A11BA

**alfatabs.ru**

### **Фармакологические свойства:**

ПИКОВИТ® ФОРТЕ содержит 11 наиболее важных витаминов в количествах, соответствующих рекомендуемым дозам для детей в возрасте от 7 лет и старше.

Витамины группы В (В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, пантотеновая кислота и никотинамид) участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров. Фолиевая кислота необходима для нормальной синтеза, регенерации и функционирования клеток крови. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Витамин D регулирует поступление кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Витамин С способствует абсорбции железа и принимает участие во многих окислительно-восстановительных процессах в организме. Витамин Е является физиологическим антиоксидантом, который защищает мембраны клеток и поддерживает функцию клеток. ПИКОВИТ® ФОРТЕ не содержит сахар.

**Фармакокинетика.**

Водорастворимые витамины (витамины группы В, витамин С и биотин) хорошо абсорбируются в количествах, соответствующих суточным потребностям организма. Количества, превышающие уровень насыщения тканей, выводятся с мочой и, иногда, с калом. Регулярный прием этих витаминов важен для поддержания необходимых концентраций в тканях, так как они накапливаются в организме в ограниченных количествах.

При пероральном приеме жирорастворимые витамины А и D хорошо абсорбируются в тонкой кишке в присутствии жиров. Абсорбция витамина Е довольно слабая (25 - 85% дозы).

### **Показания к применению**

ПИКОВИТ® ФОРТЕ рекомендуется к применению у детей с 7 лет при повышенной потребности организма в витаминах:

- снижение концентрации внимания на фоне повышенного утомления у детей школьного возраста;
- повышенные физические нагрузки (в том числе при занятиях спортом);
- повышенная потребность в витаминах на фоне сниженного аппетита;
- в комплексной терапии заболеваний при назначении антибиотиков;
- повышенная потребность в витаминах при сниженном сезонном потреблении свежих овощей и фруктов.

**alfatabs.ru**

### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Гипервитаминоз А и D.

Детский возраст до 7 лет.

В состав ПИКОВИТ® ФОРТЕ входит аспартам, содержащий фенилаланин, поэтому препарат не рекомендуется принимать пациентам с фенилкетонурией.

### **Способ применения и дозы.**

Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания.

Детям с 7 лет: по 1 таблетке один раз в день после еды.

При плохом аппетите ребенку следует давать по 1 таблетке в день в течение 2 месяцев.

### **Побочное действие.**

Возможны аллергические реакции. В таких случаях следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

ПИКОВИТ® ФОРТЕ содержит 0,6 г мальтола, в связи с этим, прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать диарею. При возникновении побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### **Передозировка.**

При передозировке, развивающейся на фоне приема высоких доз препарата более 1 месяца, может развиваться гипервитаминоз витаминов А и D.

Длительное применение высоких доз витамина B<sub>6</sub> может вызвать развитие периферической нейропатии.

**alfatabs.ru**

### **Особые указания.**

При необходимости одновременного приема других витаминных препаратов следует проконсультироваться у врача.

**Больные сахарным диабетом** могут принимать ПИКОВИТ® ФОРТЕ. В то же время, следует помнить, что одна таблетка содержит 0,6 г мальтола. Для метаболизма мальтола необходим инсулин, хотя благодаря медленному гидролизу и всасыванию в желудочно-кишечном тракте, потребность в инсулине мала. Энергетическая ценность одной таблетки составляет приблизительно 6 кДж (1,4 ккал).

### **Форма выпуска:**

Таблетки, покрытые оболочкой. По 15 таблеток в блистере. По 2 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

### **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

3 года.

Не применять препарат после истечения срока годности.

**Производитель:**

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6,  
8501 Ново место, Словения.

**По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:**

123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.

Тел.: (495) 739-66-00, факс: (495) 739-66-01

**При расфасовке и/или упаковке на российском предприятии указывается:**

ООО "КРКА-РУС", 143500, Россия, Московская обл., г. Истра,

ул. Московская, д. 50

Тел.: (495) 994-70-70

Факс: (495) 994-70-78

**alfatabs.ru**