

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ

Регистрационный номер:

П № 015492/01 от 04.02.2004 г.

Торговое название: ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ

Лекарственная форма: спрей назальный

Состав на 100 мл

Действующие вещества:

Неомицина сульфат 1г, что соответствует 650 000 МЕ

Полимиксина В сульфат 1 000 000 МЕ

Дексаметазон натрий метасульфобензоат 0,025 г

Фенилэфрина гидрохлорид 0,250 г.

Вспомогательные вещества: метилпарабен, лития хлорид, лимонная кислота, лития гидроксид, макроголь 400, полисорбат 80, очищенная вода q.s. до 100 мл.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Антибиотики - аминогликозид и циклический полипептид + глюкокортикостероид + альфа-адреномиметик.

Код АТХ: [S02CA06]

Фармакологические свойства

Комбинированный противовоспалительный препарат для местного применения в отоларингологии. Обладает противовоспалительным действием дексаметазона на слизистую оболочку носа, антибактериальным действием антибиотиков неомицина и полимиксина В. При сочетании указанных антибиотиков расширяется спектр антибактериального действия на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания носовой полости и придаточных пазух.

Показания

Воспалительные и инфекционные заболевания носовой полости, глотки, придаточных пазух носа:

- острый и хронический ринит;
- острый и хронический ринофарингит;
- синуситы.

Противопоказания

- подозрение на закрытоугольную глаукому;
- одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы;
- вирусные заболевания;
- заболевания почек, сопровождающиеся альбуминурией;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст (до 2, 5 лет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Взрослым: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3-5 раз в сутки.

Детям от 2,5 до 15 лет: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза в сутки.

Длительность лечения 5-10 дней.

Побочные эффекты

Аллергические реакции, редко – кожные проявления.

Передозировка

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Беременность и период грудного вскармливания

Противопоказан в период беременности и грудного вскармливания.

Лекарственное взаимодействие

Лекарственное взаимодействие обусловлено содержанием фенилэфрина. При одновременном применении гуанетидин и препараты этой группы усиливают гипертензивный эффект фенилэфрина и, благодаря снижению симпатического тонуса гуанетидином, возможен длительный мириаза, если нельзя избежать подобной комбинации, то необходимо наблюдение врача.

Особые указания

Не применять для промывания придаточных пазух носа.

Не применять у больных с почечной недостаточностью.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с артериальной гипертензией, ИБС, гипертиреозидизмом.

Вниманию спортсменов: препарат содержит компоненты, которые могут дать положительный эффект при допинг-контроле.

Форма выпуска

Спрей назальный: светонепроницаемый полиэтиленовый флакон емкостью 15 мл с распыляющим наконечником в картонной коробке.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Список Б.

При температуре не выше 25° С в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпуск по рецепту врача.

alfatabs.ru

BOUCHARA
RECORDATI

Производитель:

Лаборатории БУШАРА-РЕКОРДАТИ

68, rue Marjolain - 92300

Леваллуа-Перре, Франция

Представительство в Москве:

Краснопресненская наб., д.12,

ЦМТ, "Международная-2", оф.742

т. 258 20 06, ф. 258 20 07

007653/V 59376.02