

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.
Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

alfatabs.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА **ТАУФОН**

Регистрационный номер: ЛС-001210

Торговое название: Тауфон.

Международное непатентованное название: Таурин (Taurine).

Химическое название: 2-Аминоэтансульфоновая кислота.

Лекарственная форма: капли глазные.

Состав. 1 мл раствора содержит:

Действующее вещество: таурин - 40 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) - 1 мг, 1 М раствор натрия гидроксида - до pH 5,0-6,5, вода для инъекций - до 1 мл.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: метаболическое средство

Код АТХ: S01XA.

Фармакологические свойства:

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина. Стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления K^+ и Ca^{2+} , улучшения условий проведения нервного импульса.

Фармакокинетика:

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению:

Препарат назначают взрослым при:

- Дистрофиях роговицы;
- Старческих, травматических, лучевых и других видах катаракт;
- Травмах роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов);
- Первичной открытоугольной глаукоме в сочетании с β -адреноблокаторами (для улучшения оттока водянистой влаги).

При всех показаниях препарат применяется в составе комплексной терапии.


Противопоказания: Индивидуальная повышенная чувствительность к таурину, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет. Возможно применение Тауфона для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Способ применения и дозы:

При катарактах Тауфон назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение трех месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом. При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение одного месяца.



При открытоугольной глаукоме (в сочетании с бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазолом и его комбинированными формами или тимололом) - по 1-2 капли 2 раза в день, за 15 - 20 мин до назначения одного из гипотензивных средств, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

Побочное действие: аллергические реакции.

Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка: Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

У больных глаукомой (открытоугольной) отмечено значительное усиление гипотензивного действия β -адреноблокаторов (тимолола и бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола) в случае совместного применения с Тауфоном.

Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянистой влаги.

Форма выпуска

Капли глазные 4 %.

1,5 мл; 2 мл или 5 мл в тубик-капельницы полимерные.

1, 2, 4, 5 или 10 тубик-капельниц с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

5 мл или 10 мл во флакон-капельницы полимерные.

1 или 2 флакон-капельницы с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

Текст инструкции по применению тубик-капельницы или флакон-капельницы нанесен на пачке.

5 мл во флаконы стеклянные.

1 флакон в комплекте с крышечкой-капельницей в стерильном исполнении и инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

5 флаконов в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.

1 контурную ячейковую упаковку в комплекте с 5 крышками-капельницами в стерильном исполнении и инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С (для препарата в тубик-капельницах).

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С (для препарата во флакон-капельницах и во флаконах).

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года в тубик-капельницах.

3 года во флакон-капельницах.

4 года во флаконах.

Срок годности препарата после вскрытия - 1 месяц.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод».

109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, 25. Тел./факс (495) 678-00-50/911-42-10. <http://www.endopharm.ru>.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата: Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод».

109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, 25, стр. 1, стр. 2.

alfatabs.ru