

## ИНСТРУКЦИЯ

### по медицинскому применению препарата Цитовир®-3

alfatabs.ru

Регистрационный номер: P N000195/01

Торговое название препарата: Цитовир®-3

Международное непатентованное или группировочное название:  
Альфа-глутамил-триптофан + Аскорбиновая кислота + Бендазол

Лекарственная форма: капсулы

Состав: на одну капсулу

Активные вещества:

Альфа-глутамил-триптофан натрий (Тимоген® натрий) 0,5 мг

Аскорбиновая кислота 50 мг

Бендазола гидрохлорид (Дибазол) 20 мг

Вспомогательные вещества:

Лактоза моногидрат, кальция стеарат  
достаточное количество для получения массы 170 мг

Состав оболочки капсул: Корпус: титана диоксид 2 %, желатин до 100%.

Крышечка: титана диоксид 2%, краситель солнечный закат жёлтый 0,2190%,  
краситель азорубин 0,0328%, желатин до 100%.

Описание:

Твёрдые желатиновые капсулы № 3 с белым корпусом и оранжевой крышечкой.  
Содержимое капсул – порошок белого или почти белого цвета без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимулирующее средство

Код АТХ: L03AX

Фармакологическое действие:

Препарат является средством этиотропной и иммуностимулирующей терапии, обладает противовирусным действием в отношении вирусов гриппа А и В и других вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные заболевания. Бендазол индуцирует в организме выработку эндогенного интерферона, обладает иммуностимулирующим действием (нормализует иммунный ответ организма). Ферменты, выработка которых индуцируется интерфероном в клетках различных органов, ингибируют репликацию вирусов.

Альфа-глутамил-триптофан (тимоген) является синергистом иммуностимулирующего действия бендазола, нормализуя Т-клеточное звено иммунитета. Аскорбиновая кислота активизирует гуморальное звено иммунитета; нормализует проницаемость капилляров, уменьшая тем самым воспаление; проявляет антиоксидантные свойства, нейтрализуя кислородные радикалы, сопровождающие воспалительный процесс; повышает устойчивость организма к инфекции.

Фармакокинетика. При приеме внутрь препарат полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность бендазола – около 80%, альфа-глутамил-триптофана – не более 15 %, аскорбиновой кислоты – 90 %. Метаболиты аскорбиновой кислоты и бендазола выводятся с мочой. Альфа-глутамил-триптофан под воздействием пептидаз расщепляется на L-глутаминовую кислоту и L-триптофан, которые используются организмом в пептидном синтезе.

# Цитовир-3®

**Показания к применению:**

Профилактика и комплексная терапия гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у взрослых и детей старше 6 лет.

**Противопоказания:**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, детский возраст до 6 лет.

**С осторожностью:** в период грудного вскармливания применение возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

**Способ применения и дозы:**

Взрослым и детям старше 6 лет с целью профилактики и лечения внутрь по одной капсуле 3 раза в день за 30 мин до еды.

Курс применения – 4 дня. Профилактический курс, при необходимости, повторяют через 3-4 недели.

**alfatabs.ru**

**Побочное действие:**

Аллергические реакции, кратковременное снижение артериального давления.

**Передозировка:**

Симптомы: кратковременное снижение артериального давления у больных с вегетососудистой дистонией, пожилого возраста. Необходим контроль за функцией почек, артериального давления и концентрации глюкозы в крови.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** не выявлено.

**Особые указания:**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:**

Капсулы. По 12 капсул в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 12 капсул в банки полимерные круглого сечения объёмом 10, 20 или 30 мл с пробкой, с уплотнительным элементом и крышкой с контролем первого вскрытия. Одна контурная ячейковая упаковка или одна банка с инструкцией по применению в пачке из картона.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Производитель/владелец регистрационного удостоверения:**

ЗАО «Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед». Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер, д. 2, тел/факс (812) 315-88-34 [www.cytomed.ru](http://www.cytomed.ru)

**Адрес места производства:**

199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, д. 57, корп. 4, лит. Ж;  
199026, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27, лит. А.