

ВАЛОКОРДИН®

(Valocordin)

alfatabs.ru

Регистрационный номер: П N012893/01

Торговое название препарата: Валокордин®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость, с ароматным запахом

Состав на 1 мл препарата:

Активные вещества:

Фенобарбитал - 18,40 мг

Этилбромизовалерианат - 18,40 мг

Вспомогательные вещества:

Мятное масло - 1,29 мг

Хмелевое масло - 0,18 мг

Этанол 96% - 469,75 мг

Вода очищенная - 411,97 мг

Фармакологическая группа: Седативное средство.

КОД АТХ N05CM

Фармакологические свойства:

Валокордин® - комбинированное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами компонентов, входящих в его состав. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектом.

Способствует снижению возбуждения центральной нервной системы и облегчает наступление естественного сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное, снотворное и спазмолитическое действие.

Показания к применению:

Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (в том числе кардиалгия, синусовая тахикардия); неврозы, сопровождающиеся раздражительностью, беспокойством, страхом; бессонница

(затруднение засыпания); состояния возбуждения, сопровождающиеся выраженным вегетативными реакциями.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; выраженные нарушения функции почек и/или печени; беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью:

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга т.к. препарат содержит этанол.

Способ применения и дозы:

Валокордин[®] принимают внутрь, до еды, с небольшим количеством жидкости.

Доза устанавливается индивидуально.

Взрослым назначают обычно по 15 - 20 капель 3 раза в день.

При нарушенном засыпании дозу можно увеличить до 30 капель.

Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Побочное действие:

Валокордин[®], как правило, хорошо переносится даже при длительном применении. В отдельных случаях, в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение.

При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений.

Редко, при повышенной чувствительности могут возникнуть кожные реакции.

При проявлении каких-либо побочных (необычных) эффектов, не отраженных в инструкции, необходимо сообщить о них лечащему врачу.

Передозировка:

Симптомы: При легкой и среднетяжелой интоксикации наблюдается сонливость, головокружение, психомоторные нарушения.

В тяжелых случаях - кома, снижение артериального давления, нарушение дыхания, тахикардия, сосудистый коллапс, снижение периферических рефлексов.

Лечение: Промыть желудок, принять активированный уголь и срочно вызвать врача.

alfatabs.ru

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

При одновременном применении Валокордина® с седативными средствами - усиление эффекта. Одновременное применение с нейролептиками и транквилизаторами усиливает, а со стимуляторами центральной нервной системы - ослабляет действие каждого из компонентов препарата. Алкоголь усиливает эффекты Валокордина® и может повышать его токсичность. Наличие в составе Валокордина® фенобарбитала может индуцировать микросомальные ферменты печени, и это делает нежелательным его одновременное применение с препаратами, которые метаболизируются в печени, поскольку их концентрация и, соответственно, эффективность будет изменяться в результате более ускоренного метаболизма (непрямые антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды и др.). Фенобарбитал ослабляет действие производных кумарина, глюкокортикоидов, гризофульвина, пероральных контрацептивных средств.

Особые указания:

При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Препарат содержит 55 объемных % этилового спирта (абсолютное содержание этилового спирта в максимальной разовой дозе (30 капель) составляет 0,469 грамм) и фенобарбитал, поэтому Валокордин® даже при правильном применении может ослаблять способность больных быстро реагировать в определенных ситуациях, как, например, при пребывании на улице или при обслуживании машин. Это особенно сильно выражается при одновременном приеме алкоголя.

При длительном применении препарата возможно формирование лекарственной зависимости; возможно накопление брома в организме и развитие отравления им.

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь.

По 20 мл, 50 мл во флаконы коричневого стекла с капельницей.
Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению
помещают в картонную пачку.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре
от 15° С до 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на
упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

Кревель Мойзельбах ГмбХ

Кревельштрассе 2, Д-53783 Айторф, Германия

Представительство в России:

119049 г. Москва, Ленинский проспект, д. 2

Тел.: (495) 955-01-01, Факс: (495) 638-45-94