

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА**

## **Гексорал®**

**alfatabs.ru**

**Регистрационный номер: П N014010/01**

**Торговое название: Гексорал®**

**Международное непатентованное название:  
гексэтидин**

**Лекарственная форма:** аэрозоль для местного применения

### **Состав:**

100 мл препарата содержат:

**действующее вещество – гексэтидин – 0,200 г;**

**вспомогательные вещества:**

полисорбат 80 – 1,400 г, лимонной кислоты моногидрат – 0,070 г, натрия сахаринат – 0,040 г, левоментол – 0,070 г, эвкалипта прутовидного листьев масло – 0,0011 г, натрия кальция эдетат – 0,100 г, этанол 96 % – 4,333 г, натрия гидроксид – q.s. до pH 5,5 ± 0,2, вода очищенная – q.s. до 100 мл; азот – q.s. до 5 бар.

**Описание:** прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.

### **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** A01AB12.

### **Фармакодинамика**

Противомикробное действие препарата «Гексорал®» связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий (антагонист тиамина). Препарат обладает широким спектром антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении

грамположительных бактерий и грибов рода *Candida*, однако препарат «Гексорал®» может также оказывать эффект при лечении инфекций, вызванных, например, *Pseudomonas aeruginosa* или *Proteus*. В концентрации 100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов бактерий. Развитие устойчивости не наблюдалось. Гексэтидин оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку.

## Фармакокинетика

Гексэтидин очень хорошо адгезируется на слизистой оболочке и практически не всасывается.

После однократного применения действующего вещества его следы обнаруживают на слизистой десен в течение 65 ч. В бляшках на зубах активные концентрации сохраняются в течение 10–14 ч после применения.

[alfatabs.ru](http://alfatabs.ru)

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки;
- при комплексном лечении тяжелых лихорадочных или гнойных заболеваний полости рта и глотки, требующих назначения антибиотиков и сульфаниламидов, тонзиллит;
- ангины (в том числе ангины с поражением боковых валиков, ангины Плаут-Винцента);
- фарингит;
- гингивит и кровоточивость десен;
- периодонтопатии (заболевания периодонта и их симптомы);
- стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), глоссит (воспаление языка), афтозные язвы (болезненное воспаление с поверхностными дефектами тканей) с целью профилактики

суперинфекций;

- инфицирование альвеол (лунок зубов) после удаления зубов;
- грибковые инфекции полости рта и глотки, особенно кандидозный стоматит (молочница);
- до и после операций в полости рта и глотки;
- дополнительная гигиена полости рта при общих заболеваниях;
- устранение неприятного запаха изо рта, особенно в случае разрушающихся опухолей полости рта и глотки;
- вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний.

[alfatabs.ru](http://alfatabs.ru)

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- детский возраст до 3 лет.

## **БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**

Сведений о каких-либо нежелательных эффектах препарата «Гексорал®» при беременности и кормлении грудью нет. Тем не менее перед назначением препарата «Гексорал®» беременным или кормящим женщинам врач должен тщательно взвесить пользу и риск лечения, учитывая отсутствие достаточных данных о проникновении препарата через плаценту и в грудное молоко.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Местно.

## **Общие рекомендации по дозированию**

### **Взрослые и дети старше 3 лет**

**alfatabs.ru**



- Однократная доза вводится в течение 1–2 с.

Если не указано иное, применяют два раза в день, предпочтительно утром и вечером. Гексэтидин адгезируется на слизистой оболочке и благодаря этому дает стойкий эффект. В связи с этим препарат следует применять после еды. Препарат «Гексорал®», аэрозоль для местного применения безопасен также при более частом применении.

## **Общие рекомендации по введению**

Препарат распыляют в полости рта или глотке. С помощью аэрозоля можно легко и быстро обработать пораженные участки. Необходимо выполнить следующие действия:

- надеть на аэрозольный баллон насадку-распылитель;
- направить конец насадки-распылителя на пораженный участок полости рта или глотки;
- во время введения препарата флакон следует удерживать постоянно в вертикальном положении, как показано на рисунке;
- ввести необходимое количество препарата, надавливая на головку насадки-распылителя в течение 1–2 с, не дышать при введении аэрозоля.



Длительность лечения определяется врачом.

Не применять детям до 3 лет.

## **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

В отдельных случаях развивались реакции повышенной чувствительности к препарату. При длительном применении возможно нарушение вкуса.

## **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

[alfatabs.ru](http://alfatabs.ru)

Гексэтидин в указанной дозировке нетоксичен. Проглатывание больших количеств препарата приводит к рвоте, поэтому значительного всасывания не ожидается. При любых случаях передозировки немедленно проконсультируйтесь с врачом. Промывание желудка необходимо в течение 2 часов после проглатывания избыточной дозы.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Не описано.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Специальных предписаний нет.

Дети могут применять препарат с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого его проглатывания или когда они не сопротивляются постороннему предмету (насадке-распылителю) во рту при применении аэрозоля и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

Препарат «Гексорал®», аэрозоль для местного применения не влияет на способность к управлению транспортными средствами и к выполнению потенциально опасных видов деятельности.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выливайте его в сточные воды и не выбрасывайте на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Аэрозоль для местного применения 0,2 %.

По 40 мл препарата в алюминиевом аэрозольном баллоне с внутренним лаковым покрытием. По 1 аэрозольному баллону в комплекте с насадкой-распылителем вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

[alfatabs.ru](http://alfatabs.ru)

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

2 года.

Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Содержимое аэрозольного баллона следует использовать в течение 6 месяцев после первого применения.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

«Фамар Орлеан», Франция

**Юридический адрес:** Famar Orleans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, France / «Фамар Орлеан», 5 авеню де Консир, 45071 Орлеан Седекс 2, Франция

## **Организация, принимающая претензии:**

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 2, тел. (495) 726-55-55

