

# ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения

## ИНГАЛИПТ

[alfatabs.ru](http://alfatabs.ru)

**Регистрационное удостоверение:**

Р N001853/01

**Торговое наименование:** Ингалипт

**Лекарственная форма:** аэрозоль для местного применения

**Состав на один баллон**

**Активные вещества:** сульфаниламид натрия – 0,750 г, сульфатиазола натрия пентагидрат – 0,750 г, тимол – 0,015 г, масло эвкалиптовое – 0,015 г, мяты перечной масло – 0,015 г.

**Вспомогательные вещества:** этанол (спирт этиловый) 95 % – 1,800 г, сахаринат натрия – 0,045 г, глицерол (глицерин) – 2,100 г, полисорбат-80 (твин-80) – 0,900 г, вода очищенная – до 30 мл, азот – от 0,3 до 0,4 г.

**Описание**

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, находящаяся в баллоне с клапаном непрерывного действия под давлением сжатого газа. Препарат при выходе из баллона образует струю с характерным запахом тимола и ментола.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное комбинированное средство

**Код ATХ:** [R02AA20]

**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат для местного применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и

горла. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и горла). Тимол, масло эвкалиптовое и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

**Показания к применению**

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный стоматит.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 3 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение Ингалипта при беременности и в период грудного вскармливания. В состав препарата входят сульфаниламиды, способные проникать при местном применении через плаценту, обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия. При необходимости использования препарата в период лактации необходимо прекратить грудное вскармливание; проникает в грудное молоко, может вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

## **Способ применения и дозы**

Применяется местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона, распыляют взвесь в полость рта 1-2 секунды. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

## **Побочное действие**

Аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

При появлении побочных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

## **Передозировка**

Признаки острого отравления при приеме внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу.

Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение. При необходимости проводят оксигено- и трансфузионную терапию.


## **Особые указания**

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача!

Дети могут применять препарат с такого возраста, когда они не сопротивляются постороннему предмету (аппликатору) во рту при применении аэрозоля и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

Баллон не вскрывать и не нагревать.

Во время введения препарата баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!



## **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Данные о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций отсутствуют.

## **Форма выпуска**

Аэрозоль для местного применения.

По 30 мл в баллоны аэрозольные алюминиевые моноблокные, снабженные клапанами непрерывного действия и предохранительными колпачками. Каждый баллон с распылителем и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**alfatabs.ru**

**Наименование и адрес производителя/ организация, принимающая претензии**  
ОАО "Фармстандарт-Лексредства",  
305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная,  
1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13,  
[www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)