

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата СНУП®

Регистрационный номер: № ЛСР-002522/07

alfatabs.ru

Торговое название препарата: Снуп®

Международное непатентованное название: ксилометазолин

Лекарственная форма: спрей назальный

Состав

1 мл спрея назального содержит: активный ингредиент – ксилометазолина гидрохлорид 0,5 мг или 1,0 мг и другие ингредиенты – морская вода – 250,0 мг, калия дигидрофосфат – 0,45 мг, вода очищенная – 754,35 мг или 753,85 мг.

Теоретическая общая масса – 1005,3 мг.

Описание

Бесцветный прозрачный раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Противоконгестивное средство.

Код ATX R01AA07

Фармакологические свойства

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств с альфа-адреномиметической активностью, вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя отек и гиперемию слизистой оболочки носа, восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание.

Действие препарата наступает через несколько минут после его применения и продолжается в течение нескольких часов.

Фармакокинетика

При местном применении препарат практически не всасывается, поэтому его концентрация в плазме крови очень мала (современными аналитическими методами не определяется).

Показания к применению

Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, поллиноз, синусит, евстахиит, средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой носоглотки), для облегчения проведения риноскопии и других диагностических манипуляций в носовых ходах.

Противопоказания

Гиперчувствительность, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, тиреотоксикоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), беременность, детский возраст до 6 лет (для 0,1% раствора), детский возраст до 2-х лет (для 0,05% раствора).

С осторожностью

Период лактации, ишемическая болезнь сердца (стенокардия), гиперплазия предстательной железы, тиреотоксикоз, сахарный диабет.

Способ применения и дозы

Детям в возрасте с 2-х до 6 лет по 1 впрыскиванию Снуп® спрея назального 0,05% в каждую ноздрю (при необходимости можно повторить), до трех раз в день.

BD 12160
32.2463

Взрослым и детям от 6 лет по 1 впрыскиванию Снуп® спрея назального 0,1% в каждую ноздрю (при необходимости можно повторить), до трех раз в день.

Препарат не следует применять чаще 3 раз в день, продолжительность курса не более 5-7 дней.

Побочное действие

При частом и/или длительном применении – раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, парестезии, чихание, гиперсекреция.

Редко – отек слизистой оболочки полости носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение артериального давления, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения; депрессия (при длительном применении в высоких дозах).

Передозировка

Симптомы: усиление побочных эффектов.

Лечение симптоматическое, под наблюдением врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Несовместим с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами.

Особые указания

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

Не следует применять в течение длительного времени, например при хроническом рините.

Форма выпуска

Спрей назальный 0,05 % и 0,1 %.

15 мл спрея назального (150 доз) в полиэтиленовом флаконе с распылительным клапаном (ЗК система).

1 флакон с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Срок годности

5 лет.

Содержимое флакона стерильно, без консервантов.

Не использовать по истечении срока годности.

alfatabs.ru

Условия хранения

В недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.

После вскрытия флакона препарат должен быть использован в течение 3 месяцев.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

«ШТАДА Арцнаймиттель АГ», Германия

Произведено Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Германия

Штадаштрассе 2-18

D-61118 Бад Фильбель, Германия

тел.: +49-6101-603-0

факс: +49-6101-603-259

Интернет: <http://www.stada.de>

Маркетинг и дистрибуция ОАО «Нижфарм»

Претензии потребителей направлять по адресу:

603950, Россия, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

тел.: (831) 278-80-88

факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizpharm.ru>

