

ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению препарата  
**ТАНТУМ® ВЕРДЕ**

alfatabs.ru

**Регистрационный номер:**

П N014279/01 - спрей для местного применения дозированный;

П N014279/02 - таблетки для рассасывания;

П N014279/03 - раствор для местного применения.

Торговое название препарата – Тантум® Верде

Международное непатентованное название – Бензидамин

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания, спрей для местного применения дозированный, раствор для местного применения.

**СОСТАВ:**

- на одну таблетку для рассасывания:

Активный ингредиент: бензидамина гидрохлорид – 3 мг.

Вспомогательные вещества: изомальтоза, рацементол, аспартам, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор мятный, ароматизатор лимонный, краситель хинолиновый желтый (Е 104), краситель индигокармин (Е 132).

- на 100 мл раствора для местного применения 0,15%:

Активный ингредиент: бензидамина гидрохлорид – 0,15 г.

Вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин (глицерол), метилпарагидроксибензоат, ароматизатор ментоловый, сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, краситель хинолиновый желтый 70% (Е 104), краситель синий патентованный 85% (Е 131), очищенная вода.

- на 100 мл спрея для местного применения дозированного 0,255 мг/доза:

Активный ингредиент: бензидамина гидрохлорид – 0,15 г.

Вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерол, метилпарагидроксибензоат, ароматизатор ментоловый (вкусовая добавка), сахарин, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, очищенная вода.

**ОПИСАНИЕ:**

Таблетки для рассасывания 3 мг: зеленые полупрозрачные квадратные таблетки с углублением в центре с характерным мятым-лимонным запахом.

Раствор для местного применения 0,15%: прозрачная жидкость зеленого цвета с характерным запахом мяты.

Спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза: бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом мяты.

Фармакологическая группа: нестероидный противовоспалительный препарат.

Код ATХ: A01AD02

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:**

Бензидамин является нестероидным противовоспалительным препаратом, принадлежит к группе индазолов. Оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие, обладает антисептическим действием против широкого спектра микроорганизмов.

Механизм действия препарата связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.

Бензидамин оказывает антибактериальное и специфическое антимикробное действие за счет быстрого проникновения через мембранные микроорганизмы с последующим повреждением клеточных структур, нарушением метаболических процессов и лизисом клетки.

Обладает противогрибковым действием в отношении *Candida Albicans*. Вызывает структурные модификации клеточной стенки грибов и метаболических цепей мицетов, таким образом препятствует их репродукции, что явилось основанием для применения бензидамина при воспалительных процессах в ротовой полости, включая инфекционную этиологию.

**ФАРМАКОКИНЕТИКА:**

При местном применении препарат хорошо абсорбируется через слизистые оболочки и проникает в воспаленные ткани.

Экскреция препарата происходит в основном почками и через кишечник в виде метаболитов или продуктов конъюгации.

Лекарственные формы для местного применения не обладают системным действием и не проникают в грудное молоко.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Воспалительные заболевания полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии):

- гингивит, глоссит, стоматит (в т.ч. после лучевой и химиотерапии);
- ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит;
- кандидоз слизистой оболочки полости рта (в составе комбинированной терапии);
- калькулезное воспаление слюнных желез;
- после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти);
- после лечения или удаления зубов;
- пародонтоз.

При инфекционных и воспалительных заболеваниях, требующих системного лечения, необходимо применение Тантум® Верде в составе комбинированной терапии.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата;
- детский возраст до 3 лет;
- детский возраст до 12 лет (для применения раствора 0,15%);
- фенилкетонурия (для применения таблеток).

**БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:**

Возможно использование препарата во время беременности и лактации (грудного вскармливания).

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:**

**Таблетки для рассасывания 3 мг:** взрослым, больным пожилого возраста и детям с 3 лет, назначают по 1 таблетке 3–4 раза в сутки. Таблетку держать во рту до полного рассасывания (для большего эффекта желательно максимально долго).

**Раствор для местного применения 0,15%:** взрослым, больным пожилого возраста и детям с 12 лет назначают для полоскания горла или полости рта, используют по 15 мл препарата (мерный стаканчик прилагается) 2–3 раза в день.

- неразведенный раствор используется для полоскания при воспалительных процессах;
- разведенный раствор (15 мл препарата и 15 мл воды смешать в мерном стаканчике) использовать ежедневно для гигиенических полосканий рта и горла.

**Спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза:** взрослым и больным пожилого возраста назначают по 4–8 доз каждые 1,5–3 ч;

- детям в возрасте 3–6 лет – по 1–4 дозы (максимально – 4 дозы) каждые 1,5–3 ч;
- детям в возрасте 6–12 лет – по 4 дозы каждые 1,5–3 ч.

## **Курс лечения:**

- при воспалительных заболеваниях полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии): от 4 до 15 дней;
- при одонто-стоматологической патологии: от 6 до 25 дней;
- после оперативных вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти) при применении спрея и раствора: от 4 до 7 дней.

При применении препарата в течение длительных сроков, необходима консультация врача.

## **ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

**Местные реакции:** сухость во рту, чувство онемения, жжения в ротовой полости.

**Аллергические реакции:** кожная сыпь.

Очень редко: ларингоспазм.

## **ПЕРЕДОЗИРОВКА:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тантум® Верде не сообщалось.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Тантум® Верде с другими лекарственными средствами.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Если при применении раствора возникает ощущение жжения, раствор следует предварительно разбавить водой в два раза, путем доведения уровня воды до риски в градуированном стаканчике.

Следует избегать попадания спрея в глаза.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:** препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и иную деятельность требующую повышенного внимания.

## **ФОРМА ВЫПУСКА:**

**Таблетки для рассасывания 3 мг:**

- 10 таблеток, каждая из которых завернута в парафинированную бумагу, помещают в обертку из двухслойной алюминиевой фольги;

- 2 обертки с 10 таблетками в каждой вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

## **Раствор для местного применения 0,15%:**

- 120 мл раствора во флаконе бесцветного прозрачного стекла, закрытом навинчивающейся крышкой из полиэтилена с запечатывающим кольцом из полиэтилена.

- к флакону прилагается стаканчик из полипропилена, имеющий градуировку 15 и 30 мл.

- флакон вместе с градуированным стаканчиком и инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

## **Спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза:**

- 30 мл (176 доз) раствора во флаконе из полиэтилена белого цвета, снабженном помпой и нажимным устройством со складывающейся канюлей.

- 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещены в картонную пачку.

## **СРОК ГОДНОСТИ:**

**Таблетки для рассасывания – 4 года.**

**Раствор для местного применения – 4 года.**

**Спрей для местного применения дозированный 0,255 мг/доза – 4 года.**

Не использовать по истечении срока годности.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

**Таблетки для рассасывания –** при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.

**Раствор для местного применения –** при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.

**Спрей для местного применения дозированный –** при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.

**Хранить в недоступном для детей месте!**

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

## **Произведено:**

"Азиенде Кимики Риуните Анжелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А."/

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Адрес: Виа Амелия 70, Рим, Италия / Viale Amelia, 70, Rome (RM), Italy

## **Адрес представительства в Москве:**

ЗАО "Си Эс Си ЛТД". 115478, Каширское шоссе, 23, Дом Ученых ОНЦ РАМН, 2 этаж, ком. А.

тел.: (495) 324 92 30, 324 96 40; факс: (495) 324 91 40, 324 55 08

**alfatabs.ru**